

衛生局 2016 年 11 月 15 日消息

10 月誘蚊產卵器指數為 47% 衛生局持續加強滅蚊防範寨卡病毒病及登革熱

全澳 10 月份誘蚊產卵器指數錄得 47%，較去年同期的 56.1%稍低。衛生局持續加強滅蚊防範寨卡病毒病及登革熱，同時呼籲市民繼續做好家居清除積水工作，共同防控登革熱及寨卡病毒病。

為掌握白紋伊蚊的戶外孳生活動情況，衛生局自 2002 年起常規放置誘蚊產卵器進行監測，現時全澳共有約 860 個誘蚊產卵器，衛生局每月會收集誘蚊產卵器統計陽性率並計算指數。衛生局 10 月份錄得全澳平均的誘蚊產卵器指數為 47%，較去年同期的 56.1%低。在澳門半島以筷子基區及黑沙環區最高，分別為 56.8%及 55.6%，在離島則仍以路環區最高，達到 63.5%(表一)。澳門目前誘蚊產卵器指數雖然有回落，但仍屬高水平，反映登革熱等蚊傳播疾病在澳門仍有一定的傳播風險。

寨卡病毒病在拉丁美洲國家和地區持續蔓延，加上東南亞多個國家亦相繼出現本地感染個案，其中新加坡已錄得超過 400 例本地個案，該病在亞洲流行風險甚高。此外，東南亞地區的登革熱疫情亦嚴峻，澳門今年已有 10 宗從東南亞輸入的登革熱病例，病例數明顯高於往年同期。

寨卡病毒病及登革熱均是通過蚊媒傳播的疾病，澳門正值雨季，有利白紋伊蚊生長，為減低上述疾病在本澳傳播的風險，衛生局持續加強全澳各衛生黑點的滅蚊工作，以減低蚊媒的密度。衛生局人員今天已於下表二地點進行化學滅蚊或實施其他病媒控制措施。

衛生局強調，小型的容器積水是白紋伊蚊的主要孳生源，呼籲市民採取預防措施，清除工作地點和家居周圍環境的積水，杜絕蚊蟲孳生。

同時，衛生局呼籲市民如前往受寨卡病毒病和登革熱影響的地區，包括東南亞各國旅行時，宜穿淺色長袖衫褲，在有空調或有防蚊裝置的地方住宿，外出時使用驅蚊劑，防止被蚊叮咬；如有發熱、出疹等疑似寨卡病毒病或登革熱的症狀，應及時就醫。此外，孕婦或打算懷孕的人士應暫時避免到受寨卡病毒病影響地

區，由受寨卡病毒病影響地區回澳後，1 個月內亦應採取嚴格的防蚊措施，6 個月內應禁慾或全程使用安全套確保安全性行為；如伴侶已懷孕，安全性行為的措施應持續至分娩或回澳後 6 個月，以較長者為準。

衛生局也呼籲所有醫生留意疑似寨卡病毒病和登革熱的病人，如有懷疑，應及時作出申報和檢測，衛生局公共衛生化驗所已可為所有醫療機構提供免費檢測。市民如有疑問，可致電衛生局傳染病熱線 28700800 或瀏覽衛生局傳染病網頁 <http://www.ssm.gov.mo/csr/>。

表一 2016 年 10 月全澳誘蚊產卵器指數

10 月	筷子基區	黑沙環區	海傍區	風順堂區	塔石區	氹仔區	路環區	機場	全澳平均
誘蚊產卵器陽性率	56.8%	55.6%	43.3%	47.9%	49.7%	37.2%	63.5%	22.0%	47.0%

表二 11 月 15 日已進行化學滅蚊或實施其他病媒控制措施的地點

地點
時代工業大廈與東方晉皇臺間路段
台中街台山街市旁地盤
七潭公路祐寶閣斜對面山坡、爛屋及停車場處積水
奧林匹克大馬路長江雲石地盤
飛能便度街益隆炮竹廠
海洋大馬路側童軍總會、碼頭公園及衛生中心山邊
七潭公路葡京花園之山坡、水氹及兩邊爛尾樓 (利景台至勝景台後山)
松樹尾木屋
老虎巷木屋
何連旺街兩個地盤
松柏之家兩邊地盤 (合共兩個)
氹仔坊眾幼稚園操場邊地盤
望廈街地盤 (旅遊學院下面)
姑娘街 3 號 A, 3 號及 5 號空置舊屋
蛤巷一帶地盤和空置房屋
望廈街地盤 (旅遊學院下面)
姑娘街 3 號 A, 3 號及 5 號空置舊屋
蛤巷一帶地盤和空置房屋
主教山兒童院
學校巷聖嘉俾厄爾修院內花園
崗頂何東圖書館
崗頂聖若瑟修院門口聖母像四周花瓶
崗頂前地 1 號澳門明愛花園
崗頂劇院前花園
崗頂聖若瑟修院
聖老楞佐堂
亞婆井街 1 至 9 號空置舊屋
亞婆井前地花園
亞婆井斜巷木屋和空置房屋
海事及水務局

媽閣廟前地公廁邊和媽閣斜巷 32 至 42 號空置房屋
民政總署舊媽閣屠房後山邊草叢及菜地